


# IMPFPPLAN 2011

nach Bundesamt für Gesundheit



Alter	Basis-Impfungen	Ergänzende Impfungen
2 Monate	Diphtherie, Tetanus <sup>a)</sup> , Pertussis <sup>b)</sup> Polio <sup>c)</sup> , Hib <sup>1</sup> , Hepatitis B	Pneumokokken
4 Monate	Diphtherie, Tetanus, Pertussis Polio, Hib <sup>1</sup> , Hepatitis B	Pneumokokken
6 Monate	Diphtherie, Tetanus, Pertussis Polio, Hib <sup>1</sup> , Hepatitis B	
12 Monate	Masern, Mumps, Röteln	Pneumokokken (Nachholimpfung bis 5. Geb.)
12–15 Mte.		Meningokokken C: 1. Dosis (Nachholimpfung bis 5. Geb.)
15–24 Mte.	Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Polio, Hib <sup>1</sup> , Hepatitis B, Masern, Mumps, Röteln	
4–7 Jahre	Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Polio	
11–14 Jahre	HPV <sup>2</sup> (3 Dosen für Mädchen)	
11–15 Jahre	dT <sup>3</sup> oder dTp <sub>a</sub> <sup>4</sup> oder dTp <sub>a</sub> -IPV <sup>5</sup> Hepatitis B (2 oder 3 Dosen je nach Impfstoff) Varizellen <sup>d)</sup> (2 Dosen)	Meningokokken C: 2. Dosis (od. Nachholimpfung bis 20 Jahre)
15–26 Jahre	Nachholimpfung HPV <sup>2</sup> (3 Dosen für Mädchen und junge Frauen)	
Erwachsene	Diphtherie, Tetanus (alle 10 Jahre) Polio (Auffrischung vor Reisen in Risikogeb.) Nachholimpfung Masern, Mumps, Röteln Nachholimpfung Varizellen <sup>6</sup> Grippe ab 65 Jahren (jährlich) Pneumokokken ab 65 Jahren (1. Dosis)	Nachholimpfung HPV (3 Dosen)



- <sup>1</sup> Hib = *Haemophilus influenzae* Serotyp B
- <sup>2</sup> HPV = Humane Papillomaviren
- <sup>3</sup> dT = Diphtherie, Tetanus
- <sup>4</sup> dTp<sub>a</sub> = Diphtherie, Tetanus, Pertussis
- <sup>5</sup> dTp<sub>a</sub>-IPV = Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Polio
- <sup>6</sup> total 2 Dosen bis 40-jährig

- a) Tetanus = Starrkrampf
- b) Pertussis = Keuchhusten
- c) Polio = Kinderlähmung
- d) Varizellen = Windpocken / Spitze Blattern

